






PIPORTIL

PIPOTIAZINE

Psychoses aiguës ou chroniques, productives ou déficitaires

FORMES ET PRESENTATIONS : PIPORTIL : Comprimés sécables (jaunes) dosés à 10 mg de pipotiazine, présentés sous film - Etui de 20. — Gouttes buvables, solution à 4 pour cent. 1 goutte = 1 mg ; flacon compte-gouttes de 10 ml. — Ampoules injectables de 2 ml, dosées à 10 mg de pipotiazine. Boîte de 5. — PIPORTIL L4 : Ampoules injectables de 4 ml, dosées à 100 mg de pipotiazine ester palmitique. — Ampoules injectables de 1 ml, dosées à 25 mg de pipotiazine. — ester palmitique. • **PROPRIETES :** Neuroleptique majeur. • **INDICATIONS :** PIPORTIL : 1. Psychoses chroniques et aiguës, notamment schizo-phréniques à forme déficitaire ou paranoïdes, hébéphrénie, psychose hallucinatoire chronique, délires chroniques, interprétatifs et passionnels. — 2. Psychoses aiguës et poussées (voir Piportil). — 3. En psychiatrie infantile, psychoses infantiles, états prépsychotiques, dysharmonies évolutives, psychoses de la période de latence. — 4. Proposé dans certaines manifestations agressivités. • **CONTRE-INDICATIONS :** Antécédents d'agranulocytose toxique, de porphyrie, glaucome par fermeture de l'angle, risque de rétention urinaire, lié à des troubles uréthro-prostatiques, chez les utilisateurs de machines, sur le risque de somnolence, surtout en début de traitement. La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est fortement déconseillée. • **PRECAUTIONS :** L'attention des patients sera attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur le risque de somnolence, en raison de leur importance sensibilité (sédation et hypotension). — Dans les affections cardiovasculaires graves, en raison des modifications hémodynamiques, en particulier l'hypotension. — Dans les insuffisances rénales et/ou hépatiques, en raison du risque de surdosage. • **GROSSESSE** et allaitement : Il est préférable de n'utiliser la pipotiazine chez la femme enceinte ou en période d'allaitement qu'après avoir mis en balance les avantages attendus, d'une part, et l'éventuel risque thérapeutique, d'autre part. • **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :** Potentialisation des hypotenseurs, des antihypertenseurs et des déprimeurs du système nerveux central, tels que hypnotiques, tranquillisants, anesthésiques, analgésiques. • **EFFETS INDESIRABLES :** 1. Neurologiques : — Sédation ou somnolence. — Dyskinésies. — Dyskinésies précoces (torticolis spasmodiques, trismus...), cédant à l'administration d'un antiparkinsonien anticholinergique. — effets atropiniques tels que sécheresse de la bouche, constipation, troubles de l'accommodation, rétention urinaire. — 2. Endocriniens (gynécomastie, hyperprolactinémie, prise de poids pouvant être importante). — 3. Divers : — possibilité d'ictère cholestatique, aggravation. — 4. Végétatifs : — hypotension orthostatique. — effets atropiniques. — 5. Métaboliques : — impuissance, frigidité. — aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie. • **MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :** PIPORTIL : Voie orale. 1. Dans les psychoses chroniques. 10 à 20 mg par jour en moyenne, en une prise unique. — 2. Dans les états aigus, il pourra s'avérer nécessaire d'administrer per os une dose initiale supérieure à 20 mg par jour, et ce pendant quelques jours. puis, on reviendra dès que possible aux doses indiquées précédemment, soit 10 à 20 mg par jour en moyenne par jour, soit 1 ou 2 ampoules, en une ou deux injections. — 3. Dans les états aigus, on pourra également administrer le Piportil par voie I.M. à raison de 10 à 20 mg en relais du traitement per os. — Chez l'adulte de 25 à 200 mg. — Chez les sujets âgés ou fragilisés : 25 mg. Cette dose sera augmentée progressivement si nécessaire. — Chez l'enfant selon l'âge 12 à 50 mg, posologie maximale entre 25 et 100 mg. — Intervalle des injections : 4 semaines en moyenne. — Coût moyen du traitement journalier : 3,00 F (adulte). • **SURDOSAGE :** Syndrome parkinsonien gravissime, coma. — Traitement symptomatique en milieu spécialisé. • **TABLEAU A, PIPORTIL A M M, L4 191.3 (1973) — 314 197.1 (1973) — 315 067.4 (1973). PIPORTIL L4 A M M 314 048.6 (1973) — 313 723.1 (1973) — Mis sur le marché en 1973. • PRIX :** PIPORTIL : Comprimés 112,00 F + S.H.P. (étui de 20). — Gouttes buvables 204,50 F + S.H.P. (flacon de 10 ml). — Ampoules injectables 38,50 F + S.H.P. (boîte de 5). PIPORTIL L4 — Ampoule injectable de 1 ml 97,70 F + S.H.P. (étui de 3). — Ampoule inj. de 4 ml 93,40 F + S.H.P. (étui unitaire). — Remb. Sec. Soc. à 70 %. — Coll. • Pour toute information complémentaire, consulter le Dictionnaire des Spécialités.



GROUPE RHÔNE-POULENC


16 RUE CLISSON 75636 PARIS CEDEX 13

LEXOMIL

(bromazéпам)



LÈVE L'INHIBITION ANXIEUSE



PRÉSENTATION : 30 comprimés-baguettes quadriseccables blancs dosés à 6 mg de bromazéпам. **PROPRIÉTÉS :** Anxiolytique, sédatif, myorelaxant, anticonvulsivant. **INDICATION :** Anxiété sous toutes ses formes. **CONTRE-INDICATIONS :** Allergie connue aux benzodiazépines. Insuffisance respiratoire sévère. **MISE EN GARDE :** Le traitement ne doit pas être poursuivi inutilement. Un syndrome de sevrage pouvant survenir à l'arrêt brutal d'un traitement prolongé, réduire progressivement les doses en fin de traitement. **PRÉCAUTIONS :** Myasthénie : surveillance accrue. Dépression : les benzodiazépines agissent essentiellement sur la composante anxieuse de la dépression et n'en constituent donc pas un traitement à elles seules. Grossesse : éviter la prescription au cours du premier trimestre. Ne pas prescrire des doses élevées au cours du dernier trimestre. Les benzodiazépines passent dans le lait maternel : en tenir compte pendant l'allaitement. Adapter la posologie en cas d'insuffisance respiratoire modérée, d'insuffisance rénale et/ou hépatique. Attirer l'attention des conducteurs de véhicules et des utilisateurs de machines sur les risques de somnolence. L'absorption de boissons alcoolisées est formellement déconseillée pendant le traitement. **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :** Synergie additive avec les déprimeurs neuromusculaires et centraux. **EFFETS INDÉSIRABLES :** cf Vidal. Selon la dose et la sensibilité du malade : somnolence, hypotonie musculaire, sensations ébriées,

réactions paradoxales chez certains sujets, éruptions cutanées. **MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :** Chez l'adulte, la posologie initiale est de 6 mg par jour (1/4 de comprimé-baguettes le matin, 1/4 le midi, 1/2 le soir). Elle doit être ensuite adaptée individuellement. En psychiatrie, la posologie s'établit entre 6 et 18 mg ; quand la sévérité du syndrome anxieux exige l'hospitalisation, la dose journalière peut atteindre 24 voire 36 mg. Chez les sujets âgés ou atteints d'une affection débilante, la posologie doit être ajustée progressivement à partir de la dose la plus petite (1,5 mg). **C.T.J. :** 0,79 F en pratique courante. **SURDOSAGE :** Sommeil très profond ou coma selon la quantité ingérée ; traitement symptomatique en milieu spécialisé. **TABLEAU A :** A.M.M. 317 428.4. **PRIX :** 23,80 F + SHP (étui de 30). Remb. Séc. Soc. à 70%. Collectivités.

