

# SOLIAN® 50


amisulpride  
Comprimés à 50 mg

## ANTIDÉFICITAIRE RAPIDE ET MANIABLE




**PROPRIÉTÉS:** Neuroleptique caractérisé par sa rapidité d'action, antiproductif ou antidéficitaire selon la dose utilisée — **SORT DU MÉDICAMENT:** Se reporter au Vidal — **INDICATIONS:** Traitement des psychoses - États déficitaires des schizophrénies, des évolutions psychotiques résiduelles, des états d'inhibition avec ralentissement — **POSOLOGIE:** La forme Solian 50 mg est particulièrement adaptée au traitement des états déficitaires et états d'inhibition : 1 à 5 comprimés par jour (coût j.t. : 2,73 à 13,65 F). Le traitement des psychoses productives se fera plutôt à l'aide de Solian 200 mg ou de Solian injectable — **MISE EN GARDE:** Suspendre le traitement en cas d'hyperthermie, surtout s'il est utilisé à forte dose, cette hyperthermie peut être l'un des éléments du syndrome malin des neuroleptiques — **EFFETS INDÉSIRABLES:** Sédation ou somnolence (à forte dose), dyskinésies précoces (torticolis spasmodique, crises oculogyres, trismus) cédant à un antiparkinsonien anticholinergique; syndrome extrapyramidal cédant partiellement aux antiparkinsoniens anticholinergiques; dyskinésies tardives qui pourraient être observées comme avec tous les neuroleptiques au cours de cures prolongées; hypotension modérée (à forte dose), impuissance, frigidité, aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie, hyperprolactinémie, prise de poids — **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:** Déconseiller l'absorption d'alcool pendant le traitement. Réduire la posologie et prescrire des cures discontinues chez l'insuffisant rénal grave. Renforcer la surveillance chez les épileptiques et les sujets suspects d'être porteurs d'un phéochromocytome. Prudence chez le sujet âgé, le parkinsonien, la femme enceinte (par prudence, ne pas utiliser au cours du premier trimestre de grossesse) — **VIGILANCE ET CONDUITE:** Risque de somnolence — **INTERACTIONS:** Potentialisation possible des hypotenseurs, des antihypertenseurs et des déprimeurs du système nerveux central. Association à la lévodopa déconseillée — **SURDOSAGE:** Syndrome parkinsonien gravissime, coma; traitement symptomatique — **PRÉSENTATIONS:** Comprimés dosés à 50 mg d'amisulpride - boîte de 30 - A.M.M. 328445.2 - **TABLEAU A** — **PRIX PUBLIC:** Comprimés à 50 mg: 81,80 F + S.H.P. - Remboursé par la Sécurité Sociale à 70 %. Agréé aux Collectivités.

LES LABORATOIRES BRISTOL INNOVENT



*Nouvelle molécule,  
Nouvelle famille,  
Nouvelle approche...*

*... du traitement  
des troubles anxieux.*



# BUSPAR

BUSPIRONE

**BUSPAR 10 mg Buspirone. FORME ET PRÉSENTATION :** Flacon de 20 comprimés sécables. **COMPOSITION :** Comprimés à 10 mg terminés à 200 mg. **PROPRIÉTÉS :** Anxiolytique dénué d'effets sédatif, d'effet myorelaxant, d'activité anticonvulsivante. **INDICATIONS :** Anxiété sous toutes ses formes. **CONTRE-INDICATIONS :** Allergie au chlorhydrate de buspirone - Insuffisance rénale et/ou hépatique sévères. **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** Grossesse : en l'absence de données cliniques, par mesure de prudence, éviter de prescrire pendant la grossesse. Allaitement : en l'absence de donnée sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement. Dépression : la Buspirone

agit essentiellement sur la composante anxieuse de la dépression. Utilisée seule, elle ne constitue pas un traitement de la dépression et peut éventuellement en masquer les signes. Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines : Risque de sensations vertigineuses ou ébriées. Ces effets peuvent diminuer ou disparaître avec la poursuite du traitement et/ou diminution de la posologie. **MISE EN GARDE :** l'efficacité et la tolérance n'ont pas été étudiées chez les sujets de moins de 18 ans. Des cas d'élévation tensionnelle ayant été rapportés lors de l'association de la buspirone à un I.M.A.O., il est recommandé d'éviter ce type d'association. **INTERACTION :** L'association avec les benzodiazépines ne semble pas apporter de gain d'activité anxiolytique et serait, peut-être, susceptible de majorer les effets secondaires. **EFFETS INDÉSIRABLES :** Sensations vertigineuses ou ébriées, céphalées, nervosité, moiteur ou sueur, gastralgie. Généralement observés en début de traitement, ils diminuent habituellement avec la poursuite du traitement et/ou la diminution de la posologie. **POSOLOGIE :** 1/2 comprimé à 10 mg 3 fois par jour - la posologie sera adaptée en fonction des besoins du malade, elle pourra être augmentée par paliers de 5 mg tous les 2 ou 3 jours jusqu'à une dose maximale de 60 mg/jour. **TABLEAU A - AMM. 328 995.2 - Prix 96,10 F** Boîte de 20 comprimés. **C.T.I. : 7.20 à 9.60 F** Remb. Séc. Soc.



LABORATOIRES BRISTOL